




КАТАЛОГ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

MARIBO®

your partner in sugar beet...



ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ

- У 1920 році** засновано Цукровий завод Марібо.
- У 1928 році** ми представили наш перший конкурсний сорт цукрового буряка - Марібо-N.
- У 1930-ті роки** ми досягли успіху в розробці першого трипліодного сорту цукрового буряка.
- У 1950-ті роки** ми домінували на ринку з першим поліпліодним цукровим буряком - Марібо-P.
- У 1969 році** зареєстрований перший в світі сорт, стійкий до ризоманії.
- У 1990-х роках** ми були основоположниками в генній інженерії і були першими, хто видозмінив рослину (пагони) цукрових буряків.
- У 1995 році** ми назвали себе Даніско Насіння і стали частиною Даніско Груп.
- У 2009 році** ми були перейменовані в «МАРІБО» Сід.

ПРЕДСТАВНИЦТВА КОМПАНІЇ ВІДКРИТІ
БІЛЬШ НІЖ В 35 КРАЇНАХ



**«МАРІБО»
концентрує взаємозв'язок
і контроль між селекцією,
розмноженням
і виробництвом насіння
цукрових буряків**

НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 	ТИП ГІБРИДА	СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	ТЕРМІНИ ЗБИРАННЯ
 НОРІКУМ	Z (цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Ранні
НОВЕЛА	Z (цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров) Aph - (афанаміцес)	Ранні
АНГУС	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
ЛІМОЗІНЕ	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
МОЛЛІ	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
КАРЛТОН	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
БАЛТИКА	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
ДАНТЕ	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
НЕНСІ	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
ФРОНТЕРА	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров) Nt - (нематода)	Середні
НОВИЙ МАРІНО	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
НОВИЙ КСАНТУС	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
НОВИЙ ПАЛАНТІНО	NZ (урожайно- цукристий)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров)	Середні
ПРОТЕУС	N (урожайний)	Rz - (ризоманія) Cr - (церкоспоров) Rt - (ризоктоніоз)	Середні та пізні

ГІБРИДИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Класифікація та умовні позначення:

ТИП ГІБРИДУ

N — урожайний
NZ — урожайно-
цукристий
Z — цукристий

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ШКІДНИВ

Rz — ризоманія
Cr — церкоспороз
Rt — ризоктоніоз
Nt — нематоди
Aph — афаноміцес

SP — ТЕХНОЛОГІЯ SEEDPLUS

Технологія активації насіння, що зменшує ризики знищення посівів за умов:

- континентального клімату;
- ранніх або пізніх термінів сівби;
- неоптимальних попередників.



НОРІКУМ

Ранній старт – ранній цукор



Добре переносить посушливі умови. Стійкий до коренеїду, церкоспорозу та цвітухи. Покращена якість соку.

ПЕРЕВАГИ

1. Гарантовано ранній та швидкий розвиток завдяки технології «Сід Плюс»
2. Високий показник екстракції навіть за ранньої копки

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	90
Цукристість, %	19
Розташування в ґрунті, %	85

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

Z (цукристий)

Строки збирання



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



НОВЕЛА

Максимум цукру за ранньої копки

Посухостійкий гібрид для ранньої копки. Високий вміст цукру, хороша доброякісність очищеного нормального соку. Проявляє високу пластичність до ґрунтово-кліматичних умов. Має стабільно високі показники збору цукру.

ПЕРЕВАГИ

1. Досконала форма коренеплоду з мілкою боріздкою
2. Висока стійкість до коренеїда
3. високий показник чистоти соку
4. Високотолерантний до натиску церкоспори

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

Z (цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	80
Цукристість, %	20
Розташування в ґрунті, %	90

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



АНГУС

Пластичний стандарт продуктивності

Овальний коренеплід який легко викопується. Потужний листовий апарат. Збалансована стійкість до хвороб коренеплода та листового апарату. Висока врожайність коренеплодів та хороша якість соку.

ПЕРЕВАГИ

1. Високопродуктивний
2. Пластичний
3. Легко викопується
4. Високий показник чистоти соку

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	90
Цукристість, %	19
Розташування в ґрунті, %	90

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспоров)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



ЛІМОЗІНЕ

Продуктивність у повному об'ємі

Високий вміст цукру поєднано з високою врожайністю коренеплодів. Хороша стійкість до хвороб листкового апарату дозволяє збір у середні та пізні терміни без втрати цукру.

ПЕРЕВАГИ

1. Досконала форма коренеплоду
2. Мінімальне налипання ґрунту на коренеплід
3. Стійкий до макрофоміни
4. Висока технологічність сировини

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	110
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	80

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz (ризоманія)



Cr (церкоспоров)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



МОЛЛІ

Можливість для широкого розмаху

Гібрид інтенсивного напрямку. Має конічно-округлу форму коренеплода. Легко вико-
пується без втрат. Пластичний до термінів збирання, має хорошу технологічність.

ПЕРЕВАГИ

1. Коренеплоди легко викопуються
2. Пластичність у термінах збирання
3. Гарантована висока заводська
екстракція цукру

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	90
Цукристість, %	19
Розташування в ґрунті, %	85

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспоров)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



КАРЛТОН

Висока урожайність та відмінна технологічність

Урожайно-цукристий гібрид. Високий вміст цукру поєднано з високою врожайністю коренеплодів. Добре реагує на інтенсифікацію технології вирощування.

ПЕРЕВАГИ

1. Перевірений на полях України
2. Мінімальне налипання ґрунту на коренеплід
3. Екологічно пластичний

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	100
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	85

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспоров)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



БАЛТИКА

Стабільний у своїх перевагах

Збалансований за показниками урожайності та цукристості. Максимально продуктивний в умовах достатнього вологозабезпечення. Високостійкий до церкоспорозу. Має стійкість до комплексу інших хвороб листового апарату.

ПЕРЕВАГИ

1. Раннє змикання листя в міжряддях
2. Високий показник заводської екстракції цукру
3. Висока стійкість до церкоспорозу

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	95
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	80

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



ДАНТЕ

Оптимальний баланс

Гібрид з високими показниками урожайності та цукристості. Високотолерантний до церкоспорозу.

ПЕРЕВАГИ

1. Мінімальне налипання ґрунту на коренеплоди
2. Оптимальна збалансованість величини урожайності та цукристості

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	90
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	85

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Rz (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



ApH - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



НЕНСІ

Максимум вологозабезпечення – максимум продуктивності

Урожайно-цукристий гібрид для умов зрошення, достатнього та надлишкового зволоження. Максимально продуктивний за умови достатньої кількості вологи.

ПЕРЕВАГИ

1. Висока стійкість до хвороб листового апарату
2. Толерантний до збудників корневих гнилей

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	95
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	90

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспоров)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



ФРОНТЕРА

До боротьби з нематодою завжди готовий

Гібрид для насичених буряками сівозмін, полів заражених нематодою. Збалансований за рівнем урожайності, цукристості та якістю соку. Добре конкурує за рівнем продуктивності зі звичайними гібридами на не заражених нематодою площах.

ПЕРЕВАГИ

1. Відмінний результат на заражених нематодою площах.
2. Хороша технологічна якість сировини
3. Стійкий до церкоспорозу

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густота рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	85
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	85

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



Nt (нематоди)



MARINO^{NEW}

Завжди приведе до успіху

Швидкий розвиток цього гібрида надає йому пластичності до умов вирощування. Хороша лежкість коренеплодів дозволяє збільшити вихід цукру за довготривалого зберігання сировини.

ПЕРЕВАГИ

1. Хороша лежкість у кагатах
2. Стійкий до церкоспорозу
3. Пластичний до умов вирощування
4. Швидке змикання листя у міжряддях

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	100
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	85

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



Aph - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



КСАНТУС ^{NEW}

Баланс стійкостей

Гібрид з хорошим балансом стійкостей до хвороб коренеплоду та листкового апарату. Хороша доброякісність соку. Відмінна лежкість у кагатах.

ПЕРЕВАГИ

1. Відмінна лежкість у кагатах
2. Надзвичайна стійкість до церкоспорозу
3. Стійкий до кореневих гнилей

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	95
Цукристість, %	19
Розташування в ґрунті, %	85

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)



ApH - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



ПАЛАНТИНО ^{NEW}

Стократно покриває Ваші витрати

Урожайно-цукристий гібрид з розкішною листовою поверхнею. Швидко змикає листя у міжряддях. Має хороші показники очищеного нормального соку. Добре зберігається у кагатах.

ПЕРЕВАГИ

1. Відмінна лежкість у кагатах
2. Потужна листова поверхня
3. Швидке змикання листя у міжряддях

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

NZ (урожайно-цукристий)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	95
Цукристість, %	19
Розташування в ґрунті, %	85

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспоров)



ER (борошниста роса)



Arh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі



ПРОТЕУС

Потрійна стійкість – потрійна придатність до умов зрошення

Стресостійкий, пізньостиглий гібрид з посиленою стійкістю до хвороб асиміляційного апарату. Не знижує продуктивності на деградованих, не структурованих та запливаючих ґрунтах.

ПЕРЕВАГИ

1. Надзвичайна стійкість до церкоспорозу, ризоктоніозу
2. Висока стійкість до кореневих гнилей
3. Хороша лежкість у кагатах
4. Ідеально підходить для умов зрошення

Упаковка, тис. насінин

100

Тип гібриду

N (урожайний)

Строки збирання



вересень жовтень листопад

Рекомендована норма висіву, п.о./га

1,3

Рекомендована густина рослин на момент збирання, тис./га

90-110

МОРФОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ

Урожайність коренеплодів, т/га	95
Цукристість, %	18
Розташування в ґрунті, %	90

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

RZ (ризоманія)



Cr (церкоспороз)



ER (борошниста роса)




Aprh - афаноміцетна гниль (коренеїд)



Кореневі гнилі




Функції багатошарового драже




Більш високий темп проростання

4 день

росток > 15 мм – лаборат. аналіз



Темп польової схожості





ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЦУКРОВОМУ БУРЯКУ



Основне, передпосівне, припосівне удобрення	100-300 кг/га	РОСАФЕРТ
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	0,75-2,0 кг/га	ЛЕНАЦИЛ БЕТА
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	1,2-1,6 л/га	ДУАЛ ГОЛД
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	1-2 л/га	
Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	1 л/га	
Однорічні та багаторічні дводольні	0,2 кг/га	
Однорічні та багаторічні злакові	0,5-1,5 л/га	
Комплекс шкідників	1 л/га	
Стимуляція розвитку кореневої системи	2 л/га	
Листкове підживлення макро-та мікроелементами	2-3 кг/га	
Листкове підживлення мікроелементами	2-3 кг/га	
Листкове підживлення бором	1 л/га	
Листкове підживлення макро-та мікроелементами	3-4 кг/га	
Листкове підживлення макро-та мікроелементами	3-4 кг/га	
Усунення стресових факторів	0,5 л/га	
Усунення стресових факторів	1,0 л/га	
Комплекс хвороб листового апарату	0,8-1,2 л/га	
Комплекс хвороб листового апарату	0,8-1,2 л/га	
Запобігання промиванню препаратів та передчасному висиханню	0,1-0,5 л/га	МУЛЬТИМАСТР
Оптимізація якісних показників води	0,1 л/га	
Оптимізація якісних показників води	0,12 л/га	
Покращення процесу проникнення препаратів	0,1 л/га	
Покращення процесу проникнення препаратів	0,2 л/га	
Антидрифт	0,5 л/га	МІСТ КОНТРОЛ



ЗЛАТОМІТРОН

БЕТАНАЛ ЕКСПЕРТ, БЕТА ПРОФІ

ЛОНТРЕЛ ГРАНД

ШЕДОВ, ЛАЙТЕР

СУПЕРКІЛ, ДУРСБАН

КЕЛПАК

РОЗАСОЛЬ 29:10:10

РОЗАЛІК Mg, Mn, N, S

РОЗАЛІК В

РОЗАСОЛЬ 18:18:18

РОЗАСОЛЬ 08:17:41

ТЕРРА-СОРБ ФОЛІАР

ТЕРРА-СОРБ КОМПЛЕКС

АЗОЦИПЕР НЕО

МЕГНЕР

МУЛЬТИМАСТР

СПРЕЙ-ЕЙД

СПРЕЙ-ЕЙД КОМПЛЕКС

СІЛЬВЕТ ГОЛД

ДУАЛ ГОЛД

МІСТ КОНТРОЛ

Офіційний дистриб'ютор в Україні
МПП фірма Ерідон
+380 (44) 536 92 00
+380 (44) 501 88 30
office@eridon.ua
www.eridon.ua

