



ОСНОВНІ ДОЗИ ПІСЛЯ ПОСІВУ ЗГІДНО ЗІ СХЕМАМИ

2023

Приклади – результати гербіцидних досліджень. Обробка на стадії формування сім'ядолей бур'янів (+/-) збільшення/зменшення дози (див. таблицю нижче)

Схема № 1 Загальна забур'яненість – Базове рішення	Назви і норми препаратів						
	Обробка	Голтікс 700 КС	Бетанал Експерт/ МаксПро	Голтікс Титан	Карібу ВГ +Тренд 0,05%	Вензар 500 КС	ЕкоОйл/Олемікс/ Меро (75% від норми)
		л/га	л/га	л/га	г/га	л/га	л/га
	I	1,0	1,0/0,0				0,6*
	II	1,5	1,3/0,0				0,8**
III a			0,0/1,3		30		0,8**
	III б	1,5	0,0/1,5				0,8**

Схема № 2 Загальна забур'яненість + Лобода + Ріпак	Назви і норми препаратів						
	Обробка	Голтікс 700 КС	Бетанал Експерт/ МаксПро	Голтікс Титан	Карібу ВГ +Тренд 0,05%	Вензар 500 КС	ЕкоОйл/Олемікс/ Меро (75% від норми)
		л/га	л/га	л/га	г/га	л/га	л/га
	I	1,0	1,0				0,6*
	II	1,75	1,2		20		0,8***
III	1,75	1,2			30		0,8***

***якщо для обробки буде застосовуватися ад'ювант Тренд, то дозу ЕкоОйл/Олемікс/Меро необхідно зменшити до 0.5 л/га.

Схема № 3 Загальна забур'яненість + Гірчак + Підмаренник	Назви і норми препаратів						
	Обробка	Голтікс 700 КС	Бетанал Експерт/ МаксПро	Голтікс Титан	Карібу ВГ +Тренд 0,05%	Вензар 500 КС	ЕкоОйл/Олемікс/ Меро (75% від норми)
		л/га	л/га	л/га	г/га	л/га	л/га
	I		1,0	1,3			0,6*
	II		1,2	2,0		0,2	0,8**
III			1,2	2,0		0,3	0,8**

Схема № 4 Загальна забур'яненість + Журавець + Підмаренник + Собака петрушка + Вероніка + Куряче просо	Назви і норми препаратів						
	Обробка	Голтікс 700 КС	Бетанал Експерт/ МаксПро	Голтікс Титан	Фронт'єр	Вензар 500 КС	ЕкоОйл/Олемікс/ Меро (75% від норми)
		л/га	л/га	л/га	г/га	л/га	л/га
	I	1,0	1,0				0,6*
	II	1,75	1,2		0,15	0,2	0,8**
III	1,75	1,2			0,15	0,3	0,8**

*якщо бур'янки перебувають не на стадії розвинених сім'ядолей або пошкоджені, дозу ЕкоОйл/Олемікс/Меро необхідно зменшити до 0.5 л/га.

**якщо при II і III обробці бур'янки пошкоджені/пригнічені, дозу ЕкоОйл/Олемікс/Меро необхідно зменшити до 0.5 л/га.

УВАГА! На легких ґрунтах дозу препарату збільшувати не потрібно: Вензар 500 SC

ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ НОРМ ГЕРБІЦИДІВ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СХОДІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

гербіциди ґрунтові

гербіциди позакореневі/
позакореневі – ґрунтові

у % основної дози

1. Позначте збільшення та зменшення норм гербіцидів (у %), які відповідають поточним умовам

Хмарність перед обробкою

хмарність	0
змінно	5
погідно	10
сонячно	15

Розвиток рослин

дуже інтенсивний	-25
інтенсивний	-10
звичайний	0
порушений	-25
пошкоджений	*

Вологість перед обробкою

довготривало сухо/ дуже сухо	30
сухо	15
оптимально	0
мокро	-10
довготривало волого/мокро	-20

Гербіциди з попередніх обробітків – перед обробкою

16 до 20°C	-20
вище 20°C	-40

Максимальна температура після обробки

нижче 10°C	-10
11-20°C	0
21-25°C	-5
21-25°C після зимового періоду	-15
вище 25°C	-20
вище 25°C після зимового періоду	-35

Різниця температур день-ніч після обробки

16 до 20°C	-10
вище 20°C	-15

Мороз

перед обробкою до -3°C	0
перед обробкою нижче -3°C	*
після обробки до -2°C	-20
після обробки нижче -2°C	*

Хмарність після обробки

Хмарність після обробки	Час виконання обробки			
	ранок +роса	ранок	після обіду	вечір
хмарність	0	0	0	0
змінно	-5	0	-5	0
погоже	-15	-10	-15	0
сонячно	-20	-15	-30	-5

2. Розрахуйте суму у % збільшення та/або зменшення норми окремо для гербіцидів із ґрунтовою дією та листовою/ листово-ґрунтовою дією:

Збільшення дози обмежити до 50 %, беріть до уваги зареєстровані максимальні рекомендації гербіцидів!

При * та зменшенні розрахункової норми на -50 % і більше, обробку перенести/відтермінувати!

гербіциди ґрунтові (%)
гербіциди позакореневі/
позакореневі – ґрунтові

ОСНОВНІ ДОЗИ ДЛЯ БОРотьБИ З ЦЕРКОСПОРОЗОМ БУРЯКУ 2023

Умови: вологість повітря 80% , температура нічна більше 15 – денна 25 ; фаза розвитку – змикання міжрядь.

Вносимо превентивно за настання даних умов ,але до появи церкоспорозу

1	Фокс 0,6 або Медісон 0,6 + Медян екстра 1,8л/га ,або Купроксат 2,0л/га + бор 1л/га +Еко Ойл Спрей 0,5л/га
2	Альто супер 1л/га ,або Аліот 1л/га ,або ДОТ 1л/га, або ін. аналоги + Спліт0,5л/га або Лінкор 0,5л/га, або Церкоштеф 0,5л/га ,ін. + Медян екстра 2л/га, або манзат 2кг/га + бор 1л/га +Еко Ойл Спрей 0,5л/га
3	Рекс плюс 1,3л/га , або Рекс дуо 0,7л/га, або Штиль; Бірекс; Альфа-епоксил 0,8л/га

Отримуємо ефект озеленення за рахунок стробілуринів в перше внесення.

Вносимо при появі перших ознак церкоспорозу (кінець червня виявили по одній точці на 5-ти листках із 100)

1	Рекс плюс 1,3л/га + Медян екстра 1,8л/га ,або Купроксат 2,0л/га , + бор 1л/га + Еко Ойл Спрей 0,5л/га
2	Альто супер 1л/га ,або Аліот 1л/га ,або ДОТ 1л/га, або ін. аналоги + Спліт0,5л/га або Лінкор 0,5л/га, або Церкоштеф 0,5л/га ,ін. + Медян екстра 2л/га , або манзат 2кг/га + бор 1л/га + Еко Ойл Спрей 0,5л/га
3	Рекс дуо 0,7л/га, або Штиль; Бірекс; Альфа-епоксил 0,8л/га
4	Діфуре ПРО 0,7 , або Спліт0,5л/га (вносим при потребі за умов пізнього збирання кінець жовтня -листопад але не пізніше 20 днів до копки)

УВАГА!

Рекомендовані препарати, наведені вище, не слід поєднувати з іншими позакореневими добривами та інсектицидами, оскільки їх взаємодія може знизити ефективність боротьби з церкоспорозом буряку.

При необхідності проведення четвертої обробки, зв'яжіться з Вашим менеджером по сировині.

Нагадуємо - не варто повторно використовувати одні і ті ж самі фунгіциди (діючі речовини).

Дуже важливим елементом ефективної боротьби з церкоспорозом буряку, окрім доз вищевказаних препаратів, є термін першої обробки, яку слід проводити при перших симптомах ураження.

Рослини при плановому обробітку завжди повинні мати тургор листя, тому для обробітку дуже важливий час доби (ранок/вечір/ніч).

Прилипачі використовуємо при внесенні контактних мідьмістних препаратів. Норма виливу 250л/га.

Порядок змішування : Вода 2/3 об'єму бака – бор – мідь – ін фунгіцид – прилипач .

ЛИСТКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ОБРОБІТКАМИ


Церкоспороз буряку



Бура плямистість



Борошниста роса



Іржа буряка

